


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX



ABONNEMENT ANNUEL : 95 Frs Régisseur Recettes D.D.A. CCP OJON 3405-12 K

☎ (80)22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 6 - 11 Avril 1984

COLZA

► EVOLUTION LENTE DE LA VEGETATION

► CHARANCON DE LA TIGE }
MELIGETHES } PEU DE CAPTURES - A SUIVRE DÈS RECHAUFFEMENT

► CYLINDROSPORIOSE : FORTE EVOLUTION

CYLINDROSPORIOSE

SITUATION ACTUELLE ; PRECONISATIONS :

. Depuis environ une semaine, on observe une nette évolution du nombre de parcelles avec présence de cylindrosporiose, sous forme de symptômes caractéristiques (voir bulletin n° 6 du 5 avril 1984). Les départements les plus concernés : YONNE ; COTE-D'OR ; NIEVRE.

. La fréquence de pieds touchés est parfois difficile à établir, car la maladie peut se présenter sous forme de foyers.

. Cependant dans un certain nombre de situations cette FREQUENCE EST ELEVEE : supérieure à 1 pied sur 2. Dans l'impossibilité de prévoir si la maladie évoluera ou pas sur les nouvelles feuilles (pas encore de symptômes actuellement) ENVISAGER UNE INTERVENTION FONGICIDE avec :

carbendazime ou bénomyl à 500 g. de matière active/ha, SPORTAK PF à 1,5 l./ha
(l'efficacité et la rentabilité de telles interventions ne sont pas certaines).

. Pour toutes les autres parcelles où la maladie est peu présente (de l'ordre de moins de 20 % de pieds touchés) MAINTENIR LA SURVEILLANCE, NE PAS INTERVENIR DE FACON SYSTEMATIQUE.

P10

CEREALES

- EVOLUTION TOUJOURS RALENTIE DE LA VEGETATION.
- FAIBLE EVOLUTION SEPTORIOSE (PLAINE DIJONNAISE, PLAINES DOLE ET CHEMIN, BRESSE)
- PEU DE FONGICIDES A ENVISAGER AVANT LE 20 AVRIL.

BLÉ TENDRE :

. En dehors des secteurs plus avancés (Senonais, Jovinien, Plaine Dijonnaise, Plaines de Dole et Chemin, Bresse) la moitié des parcelles n'a pas encore atteint le stade 5, ce qui confirme le retard de l'année.

. Vous ne pouvez envisager raisonnablement une protection fongicide que sur moins de 5 % des champs avant le 20 Avril.

Ils correspondent aux caractéristiques suivantes :

- limon plus ou moins battant
- plus de 30 % de pieds avec piétin verse assez profond
- présence de Septoria tritici (taches avec ponctuations noires).



Redressement (5)

Stade à peine atteint pour le blé.

ORGE D'HIVER ET ESCOURGEON :

. Vous éprouvez encore des difficultés à caractériser les "dégâts" de jaunisse nanisante en raison du développement végétatif ralenti.

. Ne prévoyez une intervention vis à vis de la Rhynchosporiose avant le 20 avril que sur des parcelles atteignant le stade 6 (elles sont assez rares) en tenant compte dans le choix du produit de la présence d'autres maladies (Helminthosporiose ou Oïdium) et de l'efficacité de la spécialité vis à vis des dites affections.

. Une pourriture molle au niveau du plateau de tallage est présente dans l'YONNE et la COTE-D'OR (souvent en terres peu profondes)

- origine inconnue mais déjà rencontrée dans l'YONNE en 1983
- risque d'extension faible à nul sur les pieds sains.



1 noeud (6)

Ne pas protéger l'orge avant ce stade.